

БЯНКА

Період дозрівання:
середньоранній

ПЕРЕВАГИ:

- Висока посухостійкість
- Якість зерна
- Вміст крохмалю

ВЛАСТИВОСТІ:

- Період вегетації 115–120 днів
- Колір зерна – білий
- Маса 1000 зерен – 32–35 г
- Щільність мтелки – напіввідкрита
- Продуктивне кушення – 3
- Присутня стійкість до попелиці біотипу "С"

Рекомендована густина посіву: Південний Степ – 100 тис./га, Північний Степ – 120 тис./га

ФЕНОТИП:

Рослини низькорослі, висотою 75–90 см. Мтелка велика, напіввідкрита довжиною 25–30 см. Листя та стебла середнього розміру. Стійкий до антракнозу та летючої сажки.

Селекція: США

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Високопродуктивний гібрид зернового сорго. Новий тип зернового сорго – біле зерно на "коричневому" типі рослини. Має покращений склад зерна та чистий білий колір, що дозволяє використовувати його в харчових цілях. Танні відсутній. Високий вміст крохмалю – до 75%. Придатний до використання в харчовій промисловості. Має підвищену стійкість до несприятливих умов, забезпечує стабільну врожайність.

