

Ефективний захист рису та сорго

Цитадель®

ГЕРБІЦИД

Післясходовий селективний гербіцид системної дії для контролю широкого спектру бур'янів у посівах рису, в т.ч. різних видів плоскух (*Echinochloa* spp.) та болотних бур'янів

Діючі речовини: 25 г/л пеноксулам
 Препаративна форма: масляна дисперсія
 Хімічна група: триазолпіримідини
 Упаковка: 5 л
 Норма використання: 0,6-1,6 л/га

- Високоєфективний проти плоскух, навіть якщо вони переростають
- Одночасно контролює бульбоочерет, осокові та широколисті болотні бур'яни
- Широке вікно застосування
- Завдяки ґрунтовій дії стримує нову хвилю бур'янів
- Не має обмежень для наступних культур у сівозміні
- Єдиний післясходовий грамініцид для захисту сорго
- Дощ, через годину після застосування, не знижує ефективність дії гербіциду

Культура	Норма витрати, л/га	Фаза внесення у культури	Спектр дії	Кількість обробок за сезон
Рис	1,0-1,2	Від фази 2-4 листки до середини фази куцання у курячого проса	Злакові бур'яни	1 за сезон
	1,2-1,6	Від фази 2-4 до 6-7 листків бульбоочерету	Злакові, дводольні та болотні бур'яни	
	1,5-1,6	Обприскування за допомогою авіації у фазі 3-4 листки у рису та 5-6 листків у болотних бур'янів		
Сорго	0,6-1,0	Обприскування сорго від 2-х до 5-6-ти листків за розвитку злаків від 2-4 листків до куцання та 2-7 листків у дводольних	Злакові та дводольні бур'яни	